



SciELO/MZUSP

"L'Echange", Revue Linnéenne

Numéro spécial

M. PIC. Rédacteur

Opuscula martialis

(20 Décembre 1940)

MOULINS

" LES IMPRIMERIES RÉUNIES "

15, RUE D'ENGHIEN, 15





SciELO/MZUSP


Ce numéro spécial et supplémentaire de « L'Echange », publié sous le titre de **Opuscula martialis**, est né des circonstances et, sous son petit volume, s'inspire des restrictions diverses imposées. Les nouveautés publiées (Coléoptères paléarctiques ou exotiques), font partie du stock entomologique emmagasiné chez moi et proviennent de divers achats et de quelques-uns de mes correspondants ; les **types** se trouvent dans ma collection. Les familles sont indiquées par les premières lettres de leur désignation, par exemple : *Cur.* pour *Curculionide*, *Lam.* pour *Lampyride*. Ici seront signalées de nombreuses nouveautés dans un genre de Malacodermes peu étudié, le genre *Pholinus* Lac. (*Lampyride*) dont toutes les formes publiées ont de commun : des antennes grêles, ou un peu aplaties, d'ordinaire nettement atténuées à l'extrémité, celles-ci dépassant toujours le thorax, mais jamais très longues.

Je m'excuse de travailler en isolé, ou dans l'ignorance involontaire de la bibliographie récente.

Miccotrogus lineaticollis n. sp. [*Cur.*]. Subparallelus, niger, pro parte albo aut fulvo pubescens, antennis, tibiis tarsisque rufis ; rostro parum elongato, subarcuato ; thorace parum breve, lateraliter subarcuato, medio albo lineato ; scutello albo ; elytris fulvo pubescentibus, minute striatis, intervallis sat regulariter albo pilosis. Long. 3 mill. M^t Liban (Pic). — Voisin de *cuprifer* Panz., caractérisé par son revêtement.

Pseudolignyodes apeltariiformis v. n. **Theresæ**. Elytres ayant, en plus des bandes blanches normales, des linéoles pubescentes incomplètes. Syrie.

Xenotychius ruficolor n. sp. [*Cur.*]. Rufus, thorace medio albo vittato, elytris quinque albo vittatis : vitta suturalis communis et, in singulo, vitta discoidalis fere completa et vitta humeralis reducta ; thorace transverso, late-



raliter valde arcuato, antice strangulato, pupillato-punctato et antice paulo transverse plicato. Long. 3 mill. Tarsous. — Caractérisé par sa coloration générale rousse et ses bandes blanches inégales.

Ceutorrynchus vittatipennis n. sp. [Cur.]. Oblongo-subovatus, niger, pro parte et diverse albo squamulatus, antennis tarsisque rufis ; rostro longe arcuato ; thorace parum breve, antice angustato, transverse depresso ; elytris thorace latoribus, brevibus, postice attenuatis, striatis, intervallis alternis densiore squamulatis ; femoribus fortiter dentatis. Long. 3 mill. Chypre. — Faciès de *albo-vittatus* Germ., pattes plus foncées, cuisses plus fortement dentées, squamules moins fines.

La var. **Peyroni**, de Tarsous, a trois bandes grises au thorax, les bandes squamuleuses des élytres sont un peu jaunâtres et ces organes ont une sorte de bande transversale vers le milieu.

C. geographicus v. **n. grisescens**. Supra dense fulvo et albo squamulatus, signaturis albis parum distinctis. Egypte.

Adosogria sparsepubens n. sp. [Hét.]. Elongatus, nitidus, sat sparse albo pubescens, rufus, capite et thorace medio pro parte piceis, membris bicoloribus ; thorace dense pupillato-punctato ; elytris dense et minute punctatis aut plicatis ; articulo ultimo antennarum longissimo. Long. 12 mill. Koudou. — Voisin de *lutea* Pic, coloration moins pâle, thorax moins large.

A. impressicollis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, sat sparse albo pubescens, nigro-piceus aut brunneus, elytris paulo æneis, membris nigris. Long. 14 mill. Benito. — Diffère du précédent par le thorax subcarré et multiimpressionné, la coloration plus foncée, le dernier article des antennes moitié moins long.

Lagria s. g. n. Grandelagria. Grandis ; antennis sat brevibus, articulis elongatis, ultimo breve, acuminato ; thorace particulare, ad medium constricto ; elytris latis et elongatis. Ce s. g., établi pour l'espèce suivante, se distingue par la particulière structure de son thorax.

Grandelagria bicoloripes n. sp. [Hét.]. Elongatus, nitidus, albo pubescens, rufus, supra paulo metallicus, membris nigris, femoribus ad basin rufis ; capite diverse et dense punctato ; thorace parum breve, medio strangulato, supra impresso, minute et sparse punctato ; elytris thorace valde latioribus, elongatis, parallelis, apice attenuatis, intra humeros impressis, minute et dense punctatis, nitido plicatis ; pedibus sat gracilibus. Long. 15 mill. : Dahomey.

Notoxus Vianay n. sp. [Hét.]. Gracilis, elongatus, subopacus, rufus, aliquot pro parte obscurior, elytris nigris, ad humeros, post medium transverse et ad suturam apice griseo notatis, membris testaceis ; capite thoraceque griseo pubescentibus ; cornu multi dentato-truncato. Long. 2 mill. R. Argentine (ex Viana). — A placer près de *guyanensis* Pic.

Hylophilus sericeipennis n. sp. [Hét.]. Oblongus, nitidus, dense griseo-holosericeo pubescens, testaceus, antennis apice obscuris ; capite postice truncato, oculis nigris, minutis, valde distantibus ; antennis elongatis et gracilibus, articulo 2° globuloso, 3° et sequentibus elongatis, ultimo acuminato ; angulis anticis thoracis distinctis ; pedibus gracilibus, femoribus posticis paulo robustis. Long. 2 mill. Tanganyka (ex Conrads). — Diffère de *Raffrayi* Pic par l'aspect moins robuste, les élytres non rembrunis au milieu.

H. marginatus n. sp. Oblongus, sat dense griseo-holosericeo pubescens, nitidus, testaceus ; oculis nigris, validis, distantibus ; antennis sat brevibus, gracilibus, apice

paulo dilatatis; angulis anticis thoracis nullis; pedibus gracilibus. Long. 2 mill. Tanganyka. — Distinct du précédent par le thorax biimpressionné postérieurement et fortement marginé, la pubescence moins fournie du dessus.

H. Conradsii v. n. brunneicolor. Les élytres ne sont pas noirs, mais plus ou moins d'un roux teinté de brunâtre. Tanganyka (ex Conrads).

Gyponyx abyssinicus v. n. separatus. [Cler.]. Niger, elytris ad basin fere concoloribus, post medium luteo fasciatis et ante apicem luteo maculatis. Congo.

Orthrius lineatipes n. sp. [Cler.]. Elongatus, nitidus, luteo et fusco hirsutus, nigro-piceus, thorace pro parte luteo, minute et sparse punctato; elytris brunneis, antice et apice late luteis, fortiter, apice excepto, lineato punctatis; membris luteis, femoribus et tibiis diverse brunneo lineatis. Long. 8 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *dorsalis* Sch.

Orthrius irregularis n. sp. (s. g. n. Pieleus : Antennis sat brevibus, articulis ultimis valde dilatatis; elytris pro parte irregulariter et diverse punctatis). Elongatus, nitidus, albo hirsutus, rufus, infra corpore obscuriore, pygidio flavo, membris pro majore parte nigris. Long. 9 mill. Chine (ex Piel). — Espèce très caractérisée par ses antennes très élargies à l'extrémité et sa sculpture élytrale, caractères motivant la création d'un nouveau genre.

Mimorthrius n. g. [Cler.]. Corpus subparallelus, thorace convexo, subglobuloso; articulis ultimis palparum diversis, cylindrico aut breve et lato, pro parte excavato; antennis brevibus, apice latoribus. Genre, établi pour l'espèce nouvelle suivante, voisin de *Falsoorthrius* Pic par ses courtes antennes, mais avec une autre structure des palpes, le thorax subglobuleux, les élytres non élargis.

Mimorthrius hirsutus n. sp. [Cler.]. Longe hirsutus, piceus, capite thoraceque pro parte testaceis et dense punctatis; elytris parum elongatis, luteis, ad basin pro parte piceis, post medium sinuate nigro-piceo fasciatis, fascia ad suturam prolongata, his antice fortiter lineato-punctatis, postice irregulariter et diverse punctatis, membris testaceis, femoribus plus minusve brunneis. Long. 8 mill. Siam.

Clerus militaris v. n. rubripennis [Cler.]. Niger, elytris rubris, griseo pubescentibus et fusco hirsutis. Brésil.

Isolemidia notatipennis v. n. trinotata [Cler.]. Elytris nigro-olivaceis, ad basin, ad medium et apice flavo notatis, pedibus viridibus. Paraguay (ex Corporaal).

Microdebilissa bipartita v. n. obscura [Cer.]. Nigropiceus, capite pro parte rufescente. Chine.

Chapaon rufum v. n. ruficorne [Cer.]. Antennis rufis, apice brunnescentibus. Tonkin.

Chapaon apicale v. n. pallidum. Membris pro majore parte rufis. Tonkin.

Epipedocera atritarsis v. n. diversicolor [Cer.]. Niger, capite, thorace antice, elytris ad basin et apice abdomineque rufis. Tonkin. — *Atritarsis* Pic, typique, est noir, avec le sommet des élytres et l'abdomen roux. Voisin de *rufipennis* Pic.

Ibidiomimus rufus n. sp. [Cer.]. Rufus, membris nigris; thorace elongato, subcylindrico, fortiter punctato; elytris parum latis, paulo elongatis, diverse non dense punctatis, ad scutellum impressis. Long. 11 mill. Bangkok. — Diffère, à première vue, de *atripes* Pic par la forme moins étroite et le thorax subparallèle.

Pseudocolaspis sulcatipennis n. sp. [Phy.]. Oblongus, latus, nitidus, sparse albo pilosus, viridi-metallicus, ely-

tris ad suturam reducte cupreo vittatis, sutura pro parte cuprea ; elytris fortiter sulcatis et costatis ; pedibus gracilibus, femoribus anguste spinosis. Long. 5 mill. Gabon. — Caractérisé par sa sculpture spéciale.

P. diversesculpta mihi, du Gabon, voisin du précédent, est un peu noirâtre en dessous et vert en dessus, ainsi que sur les pattes ; se distingue facilement par la sculpture des élytres, qui est inégale, ceux-ci ayant une forte ponctuation en partie embrouillée avec des parties un peu surélevées, et étant en partie sillonnés postérieurement.

P. impressipennis n. sp. Oblongus, sat latus, nitidus, sparse albo et fusco pilosus, niger, antennis pedibusque pro parte rufis, his parum gracilibus, femoribus longe spinosis. Long. 4 mill. Assinie (ex Alluaud). — Voisin de *tuberculicollis* Jac., s'en distingue par les élytres fortement impressionnés en avant, le thorax non transversal.

P. Crampeli n. sp. Oblongus, sat latus, parum nitidus, sparse et breve albo pubescens, niger, elytris latis et brevibus, humeris prominulis, pro parte irregulariter, pro parte lineato punctatis, femoribus longe spinosis. Long. 3 mill. Congo. — Voisin de *Severini* Jac., ponctuation et pubescence des élytres différentes.

P. Alluaudi n. sp. Oblongus, sat latus, nitidus, sparse, in elytris regulariter, albo pilosus, niger, supra paulo viridescens aut subænescens, membris rufis. Long. 3,5 mill. Assinie (ex Alluaud). — Voisin du précédent, thorax à ponctuation plus écartée.

Syagrus Raffrayi n. sp. [Phy.]. Oblongus, nitidus, infra corpore pro majore parte nigro-piceo, capite thoraceque rufis, illo medio late piceo, elytris testaceis, antice transverse, lateraliter et in disco brunneo notatis, antennis nigris, ad basin testaceis, pedibus testaceis, femoribus

apice, tibiis pro parte tarsisque brunneis. Long. 5 mill. Abyssinie. — A placer près de *maculosus* Lef., s'en distingue par le thorax foncé au milieu, l'absence de macule humérale, les pattes bicolores.

S. Madoni n. sp. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus ; capite fortiter sat dense punctato ; thorace breve et lato, lateraliter subarcuato, fortiter parum sparse punctato ; elytris sat brevibus, fortiter striato-punctatis ; femoribus crassis, fere indentatis. Long. 3,5 mill. Gabon. — Plus petit que *femoratus* Lef., avec la tête plus fortement ponctuée, les élytres à stries-ponctuées nettes.

S. viridecinctus n. sp. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, thorace pro parte viridescente, elytris testaceis, vage iridescentibus, ad suturam et lateraliter viride cinctis. Long. 4 mill. Dimbroko. — Voisin de *striatipennis* Lef., mais élytres sans macules noires.

S. 4-maculatus n. sp. Oblongus, nitidus, rufus, elytris in singulo et in disco, ante et post medium, nigro maculatis, antennis apice piceis. Long. 4 mill. Afrique-C¹. — Peut se placer près de *Marshalli* Jac., antennes autrement colorées, intervalles des élytres non costés.

S. diversepunctatus n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, antennis apice brunneis ; capite minute et sparse punctato ; thorace breve et lato, parum minute et sparse punctato ; elytris antice arcuate impressis, pro parte minute striatis et lineato-punctatis, punctis antice latoribus et pro parte valde distantibus. Long. 4 mill. Gabon. — A placer près de *geniculatus* Lef.

S. semicostatus n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, elytris membrisque pallidioribus, antennis apice piceis ; elytris antice impressis, sat fortiter striato-punctatis, intervalis subconvexis aut costatis. Long. 5 mill. Gabon. — Voisin de *striatipennis* Lef., mais élytres dépourvus de parties foncées.

S. atricolor mihi, du Sénégal, voisin du précédent, est noir, avec la tête rembrunie, la base des antennes rousse, les élytres sont fortement strié-punctués avec les intervalles surélevés.

S. concoloricornis n. sp. Oblongus, parum nitidus, rufus, antennis testaceis ; elytris parum fortiter striato-punctatis ; pedibus fortiter punctatis, femoribus minute dentatis. Long. 4,5 mill. Prétoria. — Voisin de *rufobrunneus* Lef., mais les antennes sont concolores.

S. rufipennis mihi, de Windi, voisin du précédent, est plus brillant, roux avec l'avant-corps bronzé, les élytres ont des reflets irisés et sont plus longs, les stries étant presque nulles, le thorax est plus large, plus ou moins fortement punctué.

S. iridescens n. sp. Oblongus, nitidus, rufus, supra iridescens, membris testaceis ; thorace breve et lato, diverse et sparse punctato, elytris minute striato-punctatis ; femoribus validis, minute dentatis. Long. 3,5 mill. Zanzibar. — Peut se placer près de *fuscoænescens* Frm., coloration différente, pattes plus claires.

S. bicolorimembris n. sp. Oblongus, nitidus, capite thoraceque rufis, scutello elytrisque nigro-cyaneis, infra corpore nigro, pectore lateraliter rufo, antennis testaceis, apice nigris, pedibus testaceis, femoribus apice tarsisque nigris, femoribus indentatis. Long. 4 mill. Tanganyka (ex Conrads). — Diffère de *Monardi* Pic par les pattes non entièrement testacées.

S. diversipennis mihi, de la même origine, plus petit que le précédent, s'en distingue par l'écusson roux, les élytres roux à bordure latérale verte et teintés de verdâtre sur le disque en avant.

S. testaceipes n. sp. Oblongus, nitidus, niger, supra nigro-cyaneus, membris testaceis ; pedibus elongatis, fe-

moribus minute dentatis. Long. 4 mill. Bingerville. — Ressemble à *bicoloripes* Pic, mais les pattes sont entièrement testacées et le thorax est plus fortement ponctué.

La *v. n. subrufus*, du Congo, a le dessous du corps et la tête rougeâtres.

S. atricollis n. sp. Oblongus, nitidus, nigro-piceus, capite rufescente, elytris testaceis, sutura picea et brunnea, membris testaceis, antennis apice, femoribus apice tarsisque pro parte nigris; femoribus minute dentatis. Long. 4,5 mill. Abyssinie. — A placer près de *nigrolimbatus* Rits., qui a le thorax fauve.

Rhembastus apicalis n. sp. [Phy.]. Oblongus, convexus, nitidus, nigro-æneus, elytris apice rufis, capite antice, antennis, his apice nigris, pedibusque rufescentibus. Long. 3,5 mill. Tanganyka (ex Conrads). — Caractérisé par sa coloration élytrale particulière; à placer près de *variabilis* Har.

R. inapicalis mihi, de Zanzibar, voisin du précédent, mais plus large et plus court, a le dessus du corps concolore, olivâtre et la tête finement ponctuée; comme chez le précédent, les membres sont roux.

R. impressicostatus n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, niger, supra viride-ænescens, membris testaceis, elytris fortiter striato-punctatis et costatis, costis in disco antice pro parte interruptis et impressis; pedibus gracilibus, femoribus indentatis. Long. 3 mill. : Dimbroko. — Espèce caractérisée par sa forme courte, conjointement à ses côtes élytrales non régulièrement droites.

Cantharis livida v. n. mostarensis [Mal.]. Rufus, antennis apice et infra corpore pro parte nigris, elytris nigris, griseo pubescentibus. Mostar. — Voisin de *V. rufipes* Herbst, mais tête non marquée de foncé.

Malthinus sordidus v. n. brunneosulcatus [Mal.]. Flavus et rufus, elytris apice sulphureis, ad scutellum vage obscuris, thorace medio brunneo sulcato. Italie.

Malachius viridis v. n. semiviridis [Mal.]. Capite, antice luteo excepto, thoraceque cupreis; elytris viridibus, apice luteo notatis. Alpes.

Astylus pallipes v. n. postconfluens [Mal.]. Parum latus, lineis nigris elytrorum postice confluentibus, pedibus pro maiore parte nigris. Pérou.

Lycus (Merolycus) katanganus n. sp. [Mal.]. Sat angustatus, niger, thorace aurantiaco, medio nigro vittato, elytris aurantiacis, ad scutellum et apice nigro notatis, ante medium paulo strangulatis. Long. 14 mill. Congo. — Voisin de *rostratellus* Bourg., plus étroit, avec la macule apicale noire obliquement disposée.

Lycus (Lopholycus) Lavalii n. sp. Oblongo-elongatus, niger, thorace aurantiaco, medio postice nigro, elytris aurantiacis, ad scutellum breve et apice late nigris, abdomine rufo cincto. Long. 11 mill. Natal. — Voisin de *longipennis* Pic, mais thorax courtement marqué de noir, élytres à peine élargis après les épaules.

Lycus (Haplolycus) abyssinicus n. sp. Sat latus, niger, thorace transverso, aurantiaco, medio nigro sinuate vittato, elytris aurantiacis, apice parum late subarcuate nigris, abdomine luteo. Long. 16 mill. Abyssinie. — Voisin de *agrestis* Brg., mais macule apicale noire non droite.

Macrolampis flavithorax n. sp. [Lam.]. Elongatus, parallelus, supra fere uniformiter flavus, elytris in disco vage brunnescentibus, abdomine nigro, ad basin externe flavo maculato. Long. 20 mill. Bogota. — A placer près de *circumcinctus* Gem.

Lucidota Hickeri n. sp. [Lam.]. Elongatus, nitidus,

niger, elytris lateraliter albo marginatis, sutura vage albida, thorace nigro, in disco rubro bimaculato, antice pro parte flavo; antennis elongatis, paulo compressis. Long. 8 mill. Paraguay (ex Hicker). — A placer près de *Olivieri* Pic.

L. Wagneri mihi, de la R.-Argentine, de coloration analogue, a le thorax plus robuste, foncé avec le disque rouge et une bordure antérieure étroite jaunâtre.

L. Antonioi n. sp. *Elongatus*, *nitidus*, *niger*, elytris lateraliter late flavo marginatis, thorace antice flavo, in disco rubro, postice nigro, color nigra ad medium et lateraliter antice prolongata; antennis elongatis, paulo compressis. Long. 8 mill. Paraguay. — Diffère du précédent par la coloration particulière du thorax et la suture noire.

L. subnigra n. sp. *Oblongo-elongatus*, *niger*, supra luteus, thorace postice medio paulo rubro et vage brunneo bilineato; antennis elongatis, compressis; abdomine apice arcuate pallido. Long. 9 mill. Colombie. — Voisin de *conformis* E. Ol., en diffère par le dessous noir.

L. caucaensis mihi, de Cauca, de coloration analogue au précédent, mais ayant le thorax simplement un peu rembruni au milieu avec les élytres subparallèles, peu explanés.

L. luteohumeralis n. sp. *Angustatus*, *subparallelus*, fere opacus, *niger*, thorace lateraliter luteo, elytris nigris, ad humeros luteo maculatis et post medium luteo fasciatis (*forma typica*), aliquot antice anguste luteo marginatis (*v. n. externe junctus*); antennis elongatis, dentatis. Long. 8-9 mill. Pérou. — Espèce de coloration particulière.

L. Clermonti n. sp. *Sat robustus*, *nitidus*, *niger*, thorace in disco rubro bimaculato, lateraliter et antice an-

guste luteo marginato, elytris nigris, lateraliter, apice excepto, late et ad suturam anguste flavo marginatis. Long. 12 mill. Brésil. — Voisin de *Olivieri* Pic.

Leucothrix albocornuta n. sp. [Lam.]. Angustatus, nitidus, piceus, articulo ultimo antennarum plus minusve testaceo, thorace antice et lateraliter, elytris circa, apice excepto, infra corpore pro parte et pedibus diverse testaceis; antennis elongatis, depressis. Long. 10-12 mill. Guyane. — A placer près de *testaceiceps* Pic.

L. submaculata n. sp. Angustatus, subparallelus, opacus, niger, thorace lateraliter luteo, elytris nigris, ad medium luteo maculatis; antennis nigris, apice testaceis, longe dentatis. Long. 8 mill. Pérou. — A placer près de *bimaculata* Pic.

L. Grandjeani n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, brunneo-piceus, thorace circa, antennis apice femoribusque flavis, thorace in disco paulo rubro et piceo notato, elytris nigris, apice excepto, ad suturam anguste et lateraliter late flavo marginatis. Long. 8 mill. Bolivie. — Voisin de *elapsa* E. Ol.

L. discoidalis mihi, de Bolivie, a les élytres plus courts, moins foncés et à plus larges bordures claires.

L. flavipes n. sp. Angustatus, subopacus, niger, antennis apice pedibusque pro majore parte pallidis. Long. 5-5,5 mill. Pérou. — A placer près de *macrescens* E. Ol.

L. Gounellei n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, thorace flavo marginato, articulis duabus ultimis antennarum et elytris lateraliter, apice excepto, albis. Long. 4 mill. Brésil. — A placer près de *parallela* Pic.

L. Conradti n. sp. Un peu plus petit et plus brillant que *Grandjeani* mihi avec les antennes plus courtes, la

bordure latérale des élytres plus étroite, tandis que le fond de ces organes est brunâtre. Guatemala.

L. mellicula v. n. insuturalis. Elytris brevibus, nigris, ad medium externe late flavo maculatis. Maroni.

Photinus Nodieri n. sp. [Lam.]. Oblongo-elongatus, opacus, niger, thorace antice albo bimaculato, elytris, ad basin ultra medium, externe albo vittatis, margine lateralis nigra. Long. 10 mill. Brésil. — Coloration de *Platylampis fraudata* E. Ol. avec une forme bien plus allongée.

P. minasensis mihi, de Minas, est un peu plus étroit, un peu brillant, avec le thorax moins large, à peine teinté de clair en avant et, de chaque côté, la bande blanche prélatérale des élytres est plus prolongée vers l'extrémité.

P. Petaini n. sp. Elongatus, piceo-brunneus, elytris obscurioribus, thorace circa anguste flavo marginato, pedibus testaceis, abdomine brunneo, flavo notato. Long. 4,5 mill. R. Argentine. — Cette espèce et les suivantes sont à placer près de *pusillus* Gorh.

P. paulomarginatus n. sp. Elongatus, nigro-plumbeus, elytris lateraliter anguste et parum distincte griseo marginatis, thorace luteo et rubro, medio, antice excepto, piceo vittato, membris pro parte flavis. Long. 4 mill. Bolivie.

P. calisius n. sp. Elongatus, nigro-piceus, elytris brunnescentibus, thorace luteo et rubro, medio late piceo vittato. Long. 6 mill. Colombie.

P. tucumanus n. sp. Suboblongus, niger, elytris costatis, thorace luteo et rubro, medio reducte nigro vittato. Long. 5 mill. R.-Argentine. — Distinct des espèces voisines par les élytres costés.

P. Clermonti n. sp. Elongatus, nigro fuliginosus, tho-

race lateraliter rubro notato. Long. 5 mill. Brésil. — Caractérisé par le thorax largement noir au milieu.

P. nigrovittatus n. sp. Elongatus, nigro-fuliginosus, thorace luteo et rubro, medio nigro vittato, vitta antice attenuata. Long. 5 mill. R.-Argentine. — Plus étroit que le précédent, avec la bande thoracique non élargie en avant.

P. impressithorax n. sp. Elongatus, griseo fuliginosus, thorace flavo, medio nigro et late impresso, pedibus pro parte flavis. Long. 4 mill. Brésil. — Caractérisé par l'impression large du thorax.

P. tricolorithorax n. sp. Angustatus, subopacus, nigro-plumbeus, thorace fulvo et rubro, medio piceo notato, pedibus pro parte flavis. Long. 4 mill. Pérou. — Cette espèce et les suivantes sont parmi les plus petites du genre.

P. meridanus n. sp. Oblongo-elongatus, nigro-plumbeus, thorace lateraliter late rubro et flavo. Long. 3,5 mill. Vénézuéla. — Moins étroit et plus brillant que le précédent.

P. Lavalii n. sp. Elongatus, nigro-plumbeus, thorace lateraliter late flavo et paulo rubro, medio nigro stranguate vittato. Long. 3 mill. Pérou. — Caractérisé par sa petite taille et la bande nettement étranglée du thorax.

P. modestus n. sp. Oblongus, fere opacus, nigro-fuliginosus, thorace flavo, medio nigro. Long. 3 mill. Bolivie. — Voisin du précédent, ainsi que le suivant, coloration du thorax différente.

P. minutissimus n. sp. Elongatus, nigro-plumbeus, thorace rubro et flavo, medio nigro vittato, vitta postice dilatata. Long. 3 mill. Pérou.

P. minor n. sp. Elongatus, parallelus, nigro-plumbeus,

thorace brunnescente, circa flavo marginato. Long. 2,5 mill. Brésil. — Très distinct par sa petite taille jointe à sa coloration presque entièrement foncée.

P. Weygandi n. sp. Subparallelus, parum latus, supra nigro-fuliginosus, thorace lato, flavo, medio rubro (*forma typica*), aliquot breve piceo notato (v. *jatayensis*), scutello bicolorato, infra corpore pro parte rufo, abdomine pro parte flavo. Long. 7 mill. Brésil. — Coloration de *rubricollis* Gorh., mais moins robuste.

P. atroscutatus n. sp. Elongatus, subparallelus, supra niger, thorace flavo, medio rubro, abdomine nigro, medio albo notato. Long. 8 mill. Guyane. — Voisin du précédent, plus allongé et thorax moins large.

P. Conradti n. sp. Oblongo-elongatus, supra niger, thorace flavo, medio rubro, scutello testaceo, abdomine nigro, apice diverse albo. Long. 9-10 mill. Guatémala.

P. semiluteus n. sp. Elongatus, opacus, luteus, aut rufus, elytris in disco vage obscure vittatis, thorace flavo, disco rufo, nigro trisignato, membris et infra corpore pro parte piceis, abdomine flavo, ad basin piceo. Long. 8 mill. B.-Ayres. — Caractérisé par sa coloration élytrale particulière.

P. inhumeralis n. sp. Oblongo-subovatus, postice attenuatus, humeris nullis, supra niger, thorace scutelloque aurantiacis. Long. 7 mill. Pérou. — Coloration de *Conradti* mihi, mais forme différente avec les épaules nulles.

P. limbiventris n. sp. Oblongus, niger, elytris deplatanis, humeris fere nullis, thorace lateraliter late flavo, abdomine nigro, pro parte albo marginato. Long. 9 mill. Bolivie. — Peut se placer près de *Reichei* Gorh.

P. curticornis n. sp. Elongatus, parum nitidus, nigro-fuliginosus, thorace flavo, in disco breve nigro notato,

antennis brevibus. Long. 6 mill. R.-Argentine. — Voisin de *simplex* Gorh.

P. tapianus mihi, de la R.-Argentine, est plus allongé, plus brillant, avec les antennes longues, le thorax est orné d'une bande médiane noire, élargie postérieurement.

P. Boxi n. sp. Elongatus et angustatus, parum nitidus, niger, thorace flavo, paulo rubro notato et nigro vittato, vitta postice dilatata, elytris lateraliter anguste flavis, antennis elongatis. Long. 7 mill. R.-Argentine. — Voisin du précédent.

P. vittaticollis mihi, de Bolivie, voisin du précédent, mais plus petit, a un aspect mat, le thorax est plus large, moins marqué de rouge, tandis que la bande noire est un peu étranglée au milieu.

P. reductus n. sp. Elongatus, parum nitidus, fuscus, thorace rufo et flavo, postice medio piceo vittato, vitta postice dilatata, elytris griseis, ad suturam reducte et lateraliter flavo marginatis, subcostatis, antennis nigris, elongatis, pedibus testaceis. Long. 5 mill. R.-Argentine. — Voisin de *parvus* Bl.

P. santiagonus n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, nitidus, brunneus, abdomine apice flavo, thorace testaceo et rubro notato, ad medium postice et externe piceo notato, elytris brunneo griseis, flavo marginatis, in disco vage flavo vittatis. Long. 8 mill. R.-Argentine. — A placer près de *adventus* E. Ol.

P. piceicornis n. sp. Angustus, nitidus, diverse testaceus, circa pallidior, antennis piceis. Long. 9 mill. Guyane. — Caractérisé par sa coloration générale claire.

M. Pic.



SciELO/MZUSP